

## JAK STOSOWAĆ LEKI PRZECIWKRZEPLIWE PRZED BADANIAM I ZABIEGAMI ENDOSKOPOWYMI

### Kolonoskopia (wg. wytycznych ESGE 2016r.)

Leki przeciwplatekcyjne:

1. kwas acetylosalicylowy (**Aspiryna, Acard, Polocard**) - nie wymagają odstawienia
2. klopidogrel (**Clopidogrel, Plavix, Areplex, Agregex, Carder, Clopidix, Grepid, Pegorel**), tikagrelol (**Brilique**), prasugrel (**Efient**)

wymagają odstawienia i zmiany na Acard  
z wyjątkiem dwóch sytuacji:

- koronarografia + stent metalowy w ciągu miesiąca poprzedzającego kolonoskopię
- koronarografia + stent uwalniający lek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kolonoskopię

! jeśli kolonoskopia planowa - należy ją wykonać po upływie tego czasu (patrz pkt. 1. i 2.)

! jeśli kolonoskopia pilna/przyspieszona - konieczna konsultacja kardiologiczna z ustaleniem dalszego postępowania

Leki przeciwkrzepliwne:

1. Doustni antagoniści witaminy K (Warfin, Acenokumarol, Sintrom)

- przerwij lek 5 dni przed kolonoskopią
- sprawdź INR przed badaniem czy wynosi  $<1,5$
- powrót do stosowania leku w stosowanej wcześniej dawce w dniu badania - kontrola INR po tygodniu

!!! Metalowa proteza zastawkowa w pozycji mitralnej lub  
jakakolwiek sztuczna zastawka i migotanie przedsionków lub  
migotanie przedsionków i stenozą zastawki mitralnej lub

incydent zakrzepowo-zatorowy w ciągu trzech miesięcy przed kolonoskopią

- zalecana terapia pomostowana heparyną drobnocząsteczkową przez 5 dni (ostatnią dawkę należy przyjąć na 12 godzin przed kolonoskopią)

- powrót do stosowania leku w stosowanej wcześniej dawce w dniu badania

- do czasu uzyskania terapeutycznego INR terapia łączona VKA i heparyną drobnocząsteczkową

!!! Rozpoznana trombofilia - konsultacja hematologiczna

2. Nowe leki przeciwkrzepliwne

- Dabigatran (Pradaxa) - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed kolonoskopią lub 72 godziny jeśli eGFR 30-50ml/min

- Rywaroksaban (Xarelto) - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed kolonoskopią

- Eliquis - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed kolonoskopią

- Lixiana - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed kolonoskopią

