

JAK STOSOWAĆ LEKI PRZECIWKRZEPLIWE PRZED BADANIAM I ZABIEGAMI ENDOSKOPOWYMI

**ECPW ze sfinkterotomią, dylatacja zwężeń, ampulektomia, ESD, EMR,
opaskowanie/skleproterapia żyłaków, EUS z biopsją, PEG, protezowanie zwężeń
(z wyjątkiem protezowania dróg żółciowych i trzustkowych bez sfinkterotomii)**

Leki przeciwplatekcyjne:

1. kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Acard, Polocard) - nie wymagają dostawienia
2. klopidogral (Clopidogrel, Plavix, Areplex, Agregex, Carder, Clopidix, Grepid, Pegorel), tikagrelol (Brilique), prasugrel (Efient)

zamieniamy na Acard lub odstawiamy i zostawiamy stosowany wcześniej Acard
z wyjątkiem dwóch sytuacji:

1. koronarografia + stent metalowy w ciągu miesiąca poprzedzającego zabieg
2. koronarografia + stent uwalniający lek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zabieg

! jeśli zabieg planowy - należy go wykonać po upływie tego czasu (patrz pkt. 1. i 2.)

! jeśli zabieg pilny/przyspieszony - konieczna konsultacja kardiologiczna z ustaleniem dalszego postępowania

Leki przeciwkrzepliwne:

1. Doustni antagoniści witaminy K (Warfin, Acenokumarol, Sintrom)
 - przerwij lek 5 dni przed zabiegiem
 - sprawdź INR przed zabiegiem czy wynosi $<1,5$
 - powrót do stosowania leku w stosowanej wcześniej dawce w dniu zabiegu - kontrola INR po tygodniu

!!! Metalowa proteza zastawkowa w pozycji mitralnej lub

jakakolwiek sztuczna zastawka i migotanie przedsionków lub

migotanie przedsionków i stenoza zastawki mitralnej lub

incydent zakrzepowo-zatorowy w ciągu trzech miesięcy przed zabiegiem

- zalecana terapia pomostowana heparyną drobnocząsteczkową przez 5 dni

- powrót do stosowania leku w stosowanej wcześniej dawce w dniu zabiegu

- do czasu uzyskania terapeutycznego INR terapia łączona VKA i heparyną

drobnocząsteczkową

!!! Rozpoznana trombofilia - konsultacja hematologiczna

2. Nowe leki przeciwkrzepliwe:

- Dabigatran (Pradaxa) - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed zabiegiem lub 72 godziny jeśli eGFR 30-50ml/min
- Rywaroksaban (Xarelto) - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed zabiegiem
- Eliquis - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed zabiegiem
- Lixiana - ostatnia dawka co najmniej 48 godzin przed zabiegiem

!!! Acard odstawiamy zawsze do mukozektomii zmian wielkości >2 cm, dyssekcji podśluzówkowej i ampulektomii

!!! Można rozważyć odstawienie Acardu przed endoskopią zabiegową jeśli stosowany jest w profilaktyce pierwotnej (pacjenci bez przebytego zawału serca, udaru niedokrwienego mózgu, stentu w naczyniach wieńcowych)

!!! Enteroskopia diagnostyczna uznawana za zabieg małego ryzyka krwawienia

