

Wszystkie badania i zabiegi odbywają się w naszej placówce w Tychach, Aleja Bielska 105 (II piętro)
Telefony kontaktowe: 32/217 53 60, 32/217 88 66, 501 779 729.

Kolonoskopia - przygotowanie do badania z preparatem CITRAFLEET

Podana data i godziny są jedynie przykładowe.

02.02.2023

11:00 (o 10:45 przybyć do placówki)

Data badania:..... Godzina badania:.....

Preparat CITRAFLEET przyjmuje się doustnie w dwóch dawkach po 150 ml każda, w następujących godzinach:

21:00 (01.02.2023)

7:00 (02.02.2023)

Pierwsza dawka: Druga dawka:.....

Krok 1 - Wsypać zawartość 1 saszetki do filiżanki z zimną wodą (około 150 ml).

Krok 2 - Mieszać przez 2 –3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się podczas mieszania, należy odczekać przed wypiciem całego roztworu do momentu ochłodzenia. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Popić 250 ml dozwolonego płynu. Następnie, co 15-20 min wypić po 250 ml płynu, 2 litry po każdej dawce preparatu, w sumie ok. 4 litry.

Po wypiciu pierwszej dawki preparatu nie wolno już nic jeść. W celu zapewnienia właściwego nawodnienia należy pić dozwolony płyn - wodę niegazowaną lub lekką herbatę czarną lub zieloną, z wyłączeniem owocowej) do momentu ustąpienia działania przeczyszczającego.

Można pić do 2 godzin przed badaniem/zabiegiem.

Na 5 dni przed planowanym badaniem: - nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek), maku oraz pestek siemienia lnianego, pieczywa z całymi ziarnami zbóż. W dniu poprzedzającym badanie: korzystne jest spożywanie wyłącznie małych posiłków, przygotowanych z żywności ubogoresztkowej. Do takiej żywności należy: ser kremowy, twarożek, jajka (w szczególności gotowane), czysty bulion, klarowny kisiel, chleb tostowy + tłuszcz (np. margaryna, masło), w niewielkich ilościach cukier, słodzik.

Informacje ogólne:

- Osoby przyjmujące leki wpływające na krzepliwość krwi, np., Acenocumarol, Sintrom, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Plavix, Warfin, Brillique powinny skontaktować się z lekarzem prowadzącym celem ustalenia, które leki i na jaki czas przed zabiegiem muszą być odstawione oraz czy konieczna jest w tym okresie ich zamiana na heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyne, Clexane).
- Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, tarczycy, padaczkę i inne) w dniu badania powinny zażyć te leki wg. stałych, ustalonych dawek.
- Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych lub insuliny w czasie przygotowania do kolonoskopii oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka.
- Osoby potrzebujące okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

UWAGA!

Po badaniu wykonanym w znieczuleniu dożylnym nie wolno prowadzić samochodu ani obsługiwać innych pojazdów mechanicznych. Konieczna jest również obecność osoby towarzyszącej.