

Wszystkie badania i zabiegi odbywają się w naszej placówce w Tychach, Aleja Bielska 105 (II piętro)
Telefony kontaktowe: 32/217 53 60, 32/217 88 66, 501 779 729.

Badanie kapsułką endoskopową

Dokładna i bezbolesna ocena jelita cienkiego

Kapsułka endoskopowa umożliwia szczegółową ocenę jelita cienkiego. Badanie kapsułką jest wykonywane w przypadku, gdy standardowe badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) nie udzieliły odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. krwawienia z przewodu pokarmowego, przewlekły ból brzucha, podejrzenie patologii w jelicie cienkim). Badanie polega na połknięciu małej kapsułki, bezprzewodowym monitorowaniu jej pasażu w przewodzie pokarmowym za pomocą urządzenia rejestrującego obraz. Jest to badanie całkowicie bezbolesne.

Kapsułka endoskopowa to małe urządzenie, o wymiarach 24 × 11 mm, wyposażone w wysokiej rozdzielczości cyfrową kamerę, soczewkę, oświetlenie LED, baterię i małe urządzenie rejestrujące obraz. Po połknięciu kapsułka wykonuje i zapisuje obrazy błony śluzowej jelita cienkiego, które następnie są odczytywane przy pomocy zaawansowanych programów komputerowych i interpretowane przez doświadczonego lekarza.

Badanie kapsułką endoskopową – Przygotowanie do badania

Pacjent do badania pojawia się w godzinach porannych, pozostając na czczo (bez jedzenia i pica ok. 10 – 12 godzin przed badaniem, w dniu poprzedzającym wskazana dieta płynna od obiadu). W zależności od wskazań można rozważyć przygotowanie środkiem przeczyszczającym.

Badanie kapsułką endoskopową – Przebieg badania

Badanie trwa ok. 12 godzin. Obraz jest przesyłany zdalnie z kapsułki w jelicie do małego rejestratora video. Po 2 godzinach od połknięcia kapsułki można spożywać klarowne płyny, a po 4 godzinach spożyć lekki posiłek. Można też bez przeszkód korzystać z telefonów komórkowych, komputera, laptopa i sprzętu RTV.

Badanie kapsułką endoskopową – Wskazania

- krwawienie z przewodu pokarmowego o nieustalonej przyczynie (kiedy nie stwierdzono odchyień w rutynowych badaniach endoskopowych)
- przewlekła niedokrwistość z niedoboru żelaza (o nieustalonej przyczynie)
- oporny na leczenie zespół jelita nadwrażliwego (IBS)
- podejrzenie polipów i guza jelita cienkiego
- polekowe uszkodzenia jelita cienkiego
- monitorowanie choroby trzewnej i nadzór pacjentów z wieloletnią celiakią (istnieje wtedy ryzyko choroby nowotworowej jelita cienkiego)
- podejrzenie choroby Leśniowskiego - Crohna

Badanie kapsułką endoskopową – Przeciwwskazania

- zwężenie oraz niedrożność przewodu pokarmowego
- podejrzenie zwężenia oraz niedrożności przewodu pokarmowego
- ciąża
- stymulator serca (wskazana konsultacja kardiologiczna)
- zaburzenia połykania

Badanie kapsułką endoskopową – Możliwe powikłania

Powikłania po połknięciu kapsułki endoskopowej występują niezmiernie rzadko. Może dojść do utknięcia kapsułki w przewodzie pokarmowym, jednak ryzyko zdarzenia ocenia się na mniej niż 1%. Ryzyko jest nieznacznie większe (2%) u osób z chorobą Leśniowskiego - Crohna, przyjmujących przewlekłe niesteroidowe leki przeciwzapalne lub u osób z ryzykiem zwężeń w jelicie cienkim.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z informacją o badaniu za pomocą kapsułki endoskopowej i wyrażam zgodę na wykonanie tego badania.

.....
data i podpis